

# Moderna COVID-19 疫苗 孕婦接種須知



台灣婦產科醫學會 2021/06/22(初版)

## 禁忌症

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史

發燒或急性中重度疾病

18歲以下

## 常見副作用及頻率

注射部位疼痛、腫脹 92.0%

疲倦 70.0%

頭痛 64.7%

肌肉痛 61.5%

關節痛 46.4%

畏寒 45.4%

發燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) 15.5%

## 其他可能之反應及頻率

極常見 (> 1/10) 淋巴結腫大、噁心、嘔吐

常見 ( $\geq 1/100 \sim < 1/10$ ) 接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅

不常見 ( $\geq 1/1,000 \sim < 1/100$ ) 接種部位搔癢

罕見 (< 1/1,000) 顏面神經麻痺、臉部腫脹

極罕見 (< 1/10,000) 未預期之嚴重過敏反應 (呼吸困難、臉部咽喉腫脹、心跳加速、全身紅疹、暈眩、虛弱) 心肌炎 (年輕男性多、大多可治癒)、死亡 (約十萬分之一、未發現與疫苗相關)

## 注意事項:

1. 懷孕時感染COVID-19易有併發症，並致重症、甚至死亡。目前雖未有孕婦施打疫苗的長期安全性報告，但基於對已施打疫苗孕婦的研究，目前多認為利大於弊，因此建議施打。
2. 對於哺乳中婦女也建議施打疫苗，不需停止或延後哺乳。
3. 未預期之嚴重過敏反應很罕見，但有致命可能，故疫苗注射後應觀察30分鐘再離開。
4. 流產、畸胎比率在不論有無注射疫苗的孕婦並無增加。決定注射前，尤其12周內，可以諮詢您的醫師。
5. 疫苗注射後，可能會有發燒、畏寒。如體溫超過 $38^{\circ}\text{C}$ 可考慮使用藥物退燒，但目前不建議常規於注射前使用退燒藥。
6. 注射後請注意有無異常，如有持續嚴重不適，如發燒超過 48 小時、劇烈的疼痛、噁心、嘔吐，視力改變、呼吸困難、下肢腫脹、皮膚紫斑、同時建議適度補充水分及注意胎動，如有異常，應儘速就醫。
7. 第二劑通常為四周後。
8. 如有疑問可與醫師討論後，再決定施打與否。