

# Paxlovid孕婦使用說明單



台灣婦產科醫學會 2022/05/12(初版)

## 適應症

確診或居隔、居檢、自主防疫時快篩陽性及症狀開始後5天內。  
(無法用在預防感染發生或已重症時治療)

## 禁忌症

對於藥物成分有嚴重過敏反應史

嚴重肝、腎功能異常

未滿12歲、40公斤

未被診斷或控制不佳的HIV感染

## 服法

早晚各一次連用5天。  
(忘了吃! 8小時內盡快補吃,超過8小時則跳過一次,可與食物一起或單獨服用,直接吞服,勿咬碎或打碎)

## 常見副作用比安慰劑發生率高的如下

味覺失常	6% vs. <1%
腹瀉	3% vs. 2%
高血壓	1% vs. <1%
肌肉疼痛	1% vs. <1%
停藥率 2% vs. 安慰劑的4%	

## 注意事項:

- 成份: nirmatrelvir (150 mg/顆\*2) + ritonavir (100 mg/顆\*1)。
- 好處: 使感染者**重症率下降88%**
- 感染Omicron重症、死亡率約為0.2%-3.1%、0.045%-0.69%,而孕婦通常是1.5-2倍,**高齡、懷孕後期、肥胖、慢性病、未完成疫苗接種**為危險因子,尤其**同時有多項因子者更加危險**。
- 台灣至2022/5/10孕婦共確診131例,中症1例,重症2例(含死亡1例), **目前孕婦確診後重症以上比率約1.5%**。
- 懷孕相關安全性: **目前無人類懷孕相關資料**,在動物身上使用3倍劑量無不良發展結果, 10倍劑量發現會減少胎兒體重。
- 哺乳: 非禁忌症。
- 調整劑量: 中度的腎功能異常。
- 藥物交互作用**: 高達兩百多種  
(使用前請參閱臺灣CDC說明,連結如右方QRCode),  
**有其他科疾病尤其長期用藥者要特別小心,**  
建議**例行check雲端藥歷**,若有嚴重危害須回報。
- 屬**緊急授權使用**,需告知風險及獲得病人同意後才能使用。
- 代替方案: Remdesivir,得住院中用點滴注射三天。



其他藥物使用禁忌及交互作用